

Zapolin®-Globuli für Kinder

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4
- Wenn sich das Kind nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Zapolin und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Gabe von Zapolin bei einem Kind beachten?
3. Wie ist Zapolin anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Zapolin aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Zapolin und wofür wird es angewendet?

Zapolin ist ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel. Solche Arzneimittel setzen sich aus verschiedenen homöopathischen Einzelmitteln zusammen, deren Arzneimittelbilder einander ergänzen. Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Anwendungsgebiet: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören Unruhe, Zahnungsbeschwerden und unspezifische Infekte im Säuglings- und Kindesalter.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen der Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Zapolin beachten?

Zapolin darf nicht angewendet werden,

wenn das Kind allergisch gegen Chamomilla recutita, Coffea arabica, Atropa belladonna, Calcium carbonicum Hahnemanni insbesondere gegen Pflanzen aus der Familie der Korbblütler wie Kamil-

le (Chamomilla recutita), oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels ist.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- wenn die Beschwerden des Kindes trotz Behandlung länger als 7 Tage anhalten oder bei schwerem Krankheitsgefühl ist eine ärztliche Beratung dringend erforderlich.

Bei Einnahme homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Das Arzneimittel ist dann abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Arzneimittel abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht angebrachter Anwendung unerwünschte Arzneimittel - Prüfsymptome (neue Beschwerden) auftreten können.

Anwendung von Zapolin zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind keine bekannt. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn das Kind andere Arzneimittel einnimmt / anwendet kürzlich andere Arzneimittel eingenommen /angewendet hat oder beabsichtigen Ihrem Kind andere Arzneimittel zu geben.

Anwendung von Zapolin zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Allgemeiner Hinweis für Homöopathika: In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel wie z. B. Kaffee, Zigaretten, Alkohol ungünstig beeinflusst werden kann.

Schwangerschaft und Stillzeit

Dieser Punkt ist für Zapolin nicht zutreffend.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Dieser Punkt ist für Zapolin nicht zutreffend.

Zapolin enthält geringste Mengen an Lactose.

Bitte geben Sie einem Kind Zapolin erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt, wenn Ihnen bekannt ist, dass das Kind unter einer Zuckerunverträglichkeit leidet.

3. Wie ist Zapolin anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Neugeborene im Alter von 0 Tagen bis 27 Tagen, Säuglinge und Kleinkinder von 28 Tagen – 23 Monaten, Kinder von 2-11 Jahren: Alle halbe Stunde 5 Globuli maximal 6-mal am Tag wiederholen.

Zum Einnehmen.

Direkt auf die Zunge geben und zergehen lassen.

Die Wirkstoffe werden am besten über die Mundschleimhaut aufgenommen. Die Kinder sollten daher 15 Minuten nachher nichts essen.

Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem vorliegenden Krankheitsbild. Sollte innerhalb einer Woche keine Besserung eintreten oder sich die Beschwerden verschlimmern, sollten Sie mit dem Kind einen Arzt aufsuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von Zapolin angewendet haben, als Sie sollten:

Bisher wurden keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie eine Anwendung von Zapolin vergessen haben, geben Sie dem Kind nicht die doppelte Menge, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Zapolin abbrechen, werden keine Beschwerden auftreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Inst. Pharmakovigilanz
Traisengasse 5
AT-1200 WIEN
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Zapolin aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett angegebenen Verfalldatum (Verw. bis:) nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Entsorgen Sie dieses Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Zapolin enthält

8g Globuli enthalten: Die Wirkstoffe sind: Chamomilla recutita Dil. D2 0,02 g, Coffea arabica Dil. D3 0,02 g, Atropa bella-donna Dil. D3 0,02 g, Calcium carbonicum Hahnemannii Dil. D12 0,02 g

Die sonstigen Bestandteile sind: Xylit, Calciumcarbonat, Lactose in geringsten Mengen

Wie Zapolin aussieht und Inhalt der Packung

Zapolin sind weiße, matte Globuli (Streukügelchen) in Flaschen aus Braunglas mit Verschluss und Dosierhilfe aus Kunststoff.

Packungsgröße: 8 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Zulassungsinhaber und Hersteller

Dr. Peithner KG nunmehr GmbH & Co
Richard Strauss-Straße 13
1230 Wien
Tel.-Nr.: + 43 (1) 616 26 44 - 64
Fax-Nr.: + 43 (1) 616 26 44 - 851
e-mail: med.service@peithner.at

Z.Nr.: 3-00457

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2013.